

آیا نوزادتان می تواند بشنود؟



چرا نوزادان را برای ناشنوایی سنجش (غربالگری) میکنیم؟

در هنگام تولد، از هر 1000 نوزاد، دونوزاد ناشنوایی دارند. دو نوزاد دیگر نیز تا سن پنج سالگی دچار ناشنوایی می شوند. این کودکان ممکن است بعضی از صداها را بشنوند اما بقیه را از دست می دهند، که باعث می شود گویایی و زبان را سخت تر بیاموزند. این مساله می تواند به چالش در رفتار و احساسات منتهی شود.

برنامه شنوایی نوزاد سنجش شنوایی را در مورد کلیه نوزادان در بیمارستان و محیط جامعه ارائه می دهد و:

- نوزادانی را که دچار ناشنوایی دائم هستند شناسایی می کند
- به پیشرفت زبان در آنها کمک می کند تا بتوانند برای شروع مدرسه آماده شوند
- کودکانی را که در معرض خطر توسعه ناشنوایی قرار دارند شناسایی و نظاره می کند

چگونه شنوایی نوزاد من مورد سنجش قرار می گیرد؟

آزمایشهایی که بکار برده می شوند، مورد اطمینان هستند، سریع انجام می گیرند و بلافاصله نتیجه را اعلام می کنند. آنها پاسخ گوش یا مغز را نسبت به صداهای ملایمی که در گوش نوزادان نواخته اند اندازه می گیرند و ممکن است برچسب های کوچکی را روی سر نوزادان قرار دهند.

برای آماده سازی، لطفا»

- بعضی از عوامل خطرعمومی ژنتیکی -- معمولا سابقه خانوادگی برای ناشنوایی وجود ندارد

شما می توانید انتخاب کنید که:

□ **رضایت** - فقط در صورتی که خطری یافت شود با شما تماس گرفته خواهد شد

□ **نپذیرفتن** - نوزاد شما سنجش (غربالگری) عامل خطر را نخواهد داشت. تغییر در شنوایی ممکن است بلافاصله یافت نشود و می تواند رشد گفتار و زبان را به تاخیر بیندازد.

چنانچه فرزندم در سنجش شنوایی قبول نشود چه خواهد شد؟

نوزاد شما برای یک ارزیابی کامل شنوایی به یک متخصص گوش و حلق و بینی برنامه شنوایی نوزاد که تعلیمات و وسائل مورد نیاز را دارد ارجاع خواهد شد.

آیا ناشنوایی می تواند دیرتر در زندگی نوزاد من رخ دهد؟

ناشنوایی ممکن است در دوران کودکی بوجود بیاید. چنانچه در مورد پیشرفت شنوایی، گفتار یا زبان وی نگران هستید از طریق یک متخصص گوش و حلق و بینی شنوایی او را آزمایش کنید

لطفا از لینک زیر بازدید کنید
ontario.ca/infantheating

- در روز آزمایش از بکاربردن لوسیون بر روی سر نوزاد خودداری کنید

- درست قبل از قرارملاقات نوزاد خود را تغذیه کنید

- فرزند خود را درحال خواب یا استراحت به آرامی در صندلی ماشین بیاورید

و فراموش نکنید که همراه خود بیاورید:

- شماره کارت بهداشت انتاریوی نوزاد (در صورت موجود بودن)

- پتووسایر وسائل برای آرام کردن نوزادتان

- پوشک و لباس اضافه

بررسی در مورد اینکه آیا نوزادتان در معرض خطرزیاد ناشنوایی قرار دارد

نوزادانی که در معرض خطرجدی ناشنوایی قرارداشته باشند مورد نظارت قرار خواهند گرفت. نمونه ای که توسط بیمارستان یا ماما برای غربالگری خون نوزاد گرفته شده می تواند برای موارد زیر نیز مورد سنجش قرار بگیرد:

- ویروس عفونت سیتومگالو -- معمولا نوزادان هنگام تولد نشانه ای بروز نمی دهند ولی ناشنوایی می تواند دیرتر ایجاد شود