

您的宝宝的听力筛查



为什么我们要对婴儿进行听力损失筛查?

一千名婴儿中有两名出生时有听力损失。还有另外两个婴儿会在五岁前发生听力损失。这些孩子可能会听到一些声音但却会错过其他声音,这使得学习发音和讲话变得困难。这可能导致行为和情绪方面的问题。

婴儿听力服务计划为医院或社区中的所有新生儿提供听力筛查,并且:

- 识别具有永久性听力损失的新生儿
- 支持语言发展,为他们上学做好准备
- 识别和监测有听力损失风险的儿童

听力筛查结果

- 通过 - 婴儿双耳都能听到
- 通过但有风险 - 宝宝双耳可以听到,但有发生听力损失的风险。当您的宝宝15至18个月的时候,婴儿听力服务计划的听力学家将会和您预约会面进行跟进

- 转介 - 进一步测试

- 无结果 - H听力筛查不完整,需要进一步测试

} 重新
预定
听力测试

准备进一步测试:

- 在测试当天,避免在宝宝的头上擦护肤乳

- 在测试马上要开始之前喂宝宝
- 让宝宝在汽车安全座椅上安静地睡觉或休息

不要忘记带：

- 婴儿的安大略省健康卡号码（如果已经拿到）
- 毯子和其他可以让宝宝安静下来的物品
- 额外的尿布和衣服

如果我的宝宝没有通过下一个听力筛查怎么办？

您的宝宝将被转介给婴儿听力服务计划的听力学家，他们有可以进行完整听力测试所需的培训和设备。

检查您的宝宝是否有较高的听力损失风险

具有一定听力损失风险的婴儿将会被监测。由医院或助产士为新生儿血斑筛查收集的血样可以被用于筛查以下的项目：

- 巨细胞病毒感染 - 婴儿出生时通常没有症状，但听力损失可能在以后发生

- 一些常见的遗传风险因素 - 通常没有听力损失家族史

您选择：

- 同意** - 如果发现风险，您会在与听力学家会面时，或者在会面之前获知结果。
- 拒绝** - 您的宝宝将不会被筛查。可能无法及时发现听力方面的变化，可能会延误讲话和语言的发展

听力损失可能在孩子年龄大一些的时候发生吗？

听力损失可能会在儿童时期发生。如果您对宝宝的听力，讲话或语言发展有疑虑，请让听力学家对您的宝宝进行听力测试。

想了解更多信息，请访问：

ontario.ca/infanthearing