

VOTRE BÉBÉ DOIT SUBIR UNE ÉVALUATION AUDITIVE

Pourquoi vérifie-t-on si les bébés ont des troubles auditifs?

Deux bébés sur 1 000 naissent sourds ou malentendants et deux autres perdent l'ouïe avant l'âge de cinq ans. Ces enfants ont de la difficulté à entendre certains des sons, ce qui rend plus difficile l'acquisition de la parole et du langage.

Un retard dans le développement de la parole et du langage peut engendrer des troubles comportementaux et psychologiques.

Le Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d'intervention précoce fournit des services de dépistage de perte auditive pour tous les nouveau-nés, à l'hôpital ou dans une clinique communautaire. Ce programme:

- détecte les bébés nés avec une perte auditive permanente;
- soutient le développement du langage pour préparer les enfants à l'école;
- détecte et surveille les enfants à risque de développer une perte auditive.



Résultats du test de dépistage des troubles auditifs

Les résultats du test de dépistage indiquent que votre bébé doit subir une évaluation auditive:

- Renvoi** – Des tests plus détaillés sont nécessaires;
- Pas de résultat** – Les résultats sont incomplets; des tests plus détaillés sont nécessaires.
- Sauter l'étape du test de dépistage** – Une évaluation auditive complète est nécessaire.

Comment préparer votre bébé à l'évaluation auditive

Votre bébé **doit** être endormi pendant l'évaluation. Le bébé doit arriver au rendez-vous **fatigué et prêt à boire**, sinon le rendez-vous pourrait être reporté.

Avant l'évaluation:

- ne mettez pas de lotion sur la tête du bébé le jour de l'évaluation;
- gardez le bébé éveillé quelques heures avant la visite;
- nourrissez le bébé à la clinique, juste avant le début de l'évaluation.

Apportez:

- une couverture et des articles pour nourrir et calmer le bébé;
- des couches et des vêtements de rechange.

Que faire si votre bébé a une perte auditive?

L'audiologiste vous expliquera:

- les effets de la perte auditive sur votre bébé;
- l'amélioration de l'ouïe que la technologie peut apporter;
- les services et les technologies disponibles pour aider votre enfant.

Une perte auditive peut-elle se produire pendant l'enfance?

Une perte auditive peut se produire pendant l'enfance. Vous devriez faire vérifier l'ouïe de votre bébé par un audiologiste si vous craignez un retard de développement de l'ouïe, de la parole ou du langage.

Votre bébé est-il à risque de développer une perte auditive?

Les bébés qui ont des risques de perte auditive seront surveillés. Un échantillon de sang a été prélevé par l'hôpital ou la sage-femme lors du test de dépistage des nouveau-nés par la tache de sang. Cet échantillon peut être utilisé pour déceler:

- les infections causées par le cytomégalovirus – un virus qui ne s'accompagne généralement d'aucun symptôme à la naissance, mais qui peut causer une perte auditive par la suite;
- certains facteurs de risque génétiques – généralement sans qu'il y ait des antécédents familiaux de perte auditive.

Vous avez:

- consenti** – les résultats vous seront communiqués lors de votre consultation chez l'audiologiste ou plus tôt si un risque est décelé;
- refusé** – le bébé ne subira pas cette partie du dépistage. Une détérioration auditive risque de ne pas être dépistée rapidement et de retarder le développement de la parole et du langage.

Pour en savoir plus, consultez:
ontario.ca/troublesauditifsneonatal