

TEST DE DÉPISTAGE NÉONATAL DES TROUBLES AUDITIFS CHEZ VOTRE BÉBÉ



Pourquoi vérifie-t-on si les bébés ont des troubles auditifs?

Deux bébés sur 1 000 naissent sourds ou malentendants et deux autres perdent l'ouïe avant l'âge de cinq ans. Ces enfants ont de la difficulté à entendre certains des sons, ce qui rend plus difficile l'acquisition de la parole et du langage. Un retard dans le développement de la parole et du langage peut engendrer des troubles comportementaux et psychologiques.

Le Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d'intervention précoce fournit des services de dépistage de perte auditive pour tous les nouveau-nés, à l'hôpital ou dans une clinique communautaire. Ce programme:

- détecte les bébés nés avec une perte auditive permanente;
- soutient le développement du langage pour préparer les enfants à l'école;
- détecte et surveille les enfants à risque de développer une perte auditive.

Résultats du test de dépistage des troubles auditifs

- Satisfaisant** – Votre bébé entend des deux oreilles.
- Satisfaisant, mais a des risques** – Votre bébé entend des deux oreilles, mais court un risque de perte auditive. L'audiologiste fixera une date d'évaluation lorsque votre bébé aura entre 15 et 18 mois.
- Renvoi** – D'autres tests sont nécessaires.
- Pas de résultat** – Le test de dépistage est incomplet et d'autres tests sont nécessaires.

Un autre test de dépistage sera fixé.

Avant le prochain test:

- ne mettez pas de lotion sur la tête du bébé le jour du test de dépistage;
- nourrissez le bébé juste avant le rendez-vous;
- emmenez le bébé endormi ou assis tranquillement dans son siège d'auto.

Apportez:

- le numéro de carte Santé de l'Ontario du bébé (s'il en a une);
- une couverture et d'autres articles pour calmer le bébé;
- des couches et des vêtements de rechange.

Et si mon bébé ne passe pas le prochain test de dépistage?

Votre bébé sera orienté vers un audiologiste du Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d'intervention précoce possédant les connaissances et le matériel nécessaires pour mener une évaluation audiolinguistique complète.

Votre bébé est-il à risque de développer une perte auditive?

Les bébés qui ont des risques de perte auditive seront surveillés. Un échantillon de sang a été prélevé par l'hôpital ou la sage-femme lors du test de dépistage des nouveau-nés par la tache de sang. Cet échantillon peut être utilisé pour déceler:

- les infections causées par le cytomégalovirus – virus qui ne s'accompagne généralement d'aucun symptôme à la naissance, mais qui peut causer une perte auditive par la suite;
- certains facteurs de risque génétiques – généralement sans qu'il y ait des antécédents familiaux de perte auditive.

Vous avez:

- consenti** – les résultats ne vous seront communiqués que si un risque est décelé;
- refusé** – le bébé ne subira pas cette partie du dépistage. Une détérioration auditive risque de ne pas être dépistée rapidement et de retarder le développement de la parole et du langage.

Une perte auditive peut-elle se produire pendant l'enfance?

Une perte auditive peut se produire pendant l'enfance. Vous devriez faire vérifier l'ouïe de votre bébé par un audiologiste si vous craignez un retard de développement de l'ouïe, de la parole ou du langage.

Pour en savoir plus, consultez:
ontario.ca/troublesauditifsneonatal